



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Grandes Cultures

POITOU - CHARENTES

Bulletin Technique n° 06 du 17 Mars 2004 - 1 page

COLZA : Stade D2 - E Mélégèthes

Des **captures importantes** ont eu lieu en **toutes zones** depuis le début de la semaine. L'**activité** au champ reste malgré tout assez **modeste** par rapport à l'importance des captures.

Les **seuils classiques** de 2 à 3 mélégèthes par inflorescence aux stades D2-E ne sont **pas atteints**, sauf exception à vérifier. Rappelons que ces seuils ont été revus à la hausse suite à des travaux récents (voir Note commune INRA-SPV-CETIOM). Ces nouveaux seuils sont de **3 à 4 au stade D et de 7 à 8 au stade E**. Ce stade E sera rapidement atteint dans la plupart des parcelles.

Rappelons également que le **mélégèthe** se comporte comme un **pollinisateur** à partir de début floraison (proche sur certaines parcelles).

Pour toutes les raisons évoquées en préambule, le **traitement spécifique mélégèthe** ne nous semble **pas utile** une nouvelle fois cette année ; sauf exception à vérifier.

Pucerons cendrés

Quelques rares colonies sont observées en Nord Vienne et dans la plaine de Neuville - Mirebeau (86).

Les seuils de 2 colonies au mètre carré ne sont pas atteints ; il est trop tôt pour intervenir.

POIS Sitones

On n'observe pas d'activité actuellement.

Surveillez les cultures dès la levée et faites un bilan dès le stade 2 feuilles. Une intervention sera nécessaire si vous atteignez la note 2 (voir dossier Avertel).

LUPIN D'HIVER Anthracnose

Les observations réalisées la semaine 12, confirment l'absence de la maladie. Ne pas intervenir..

BLE : Stade redressement à épi 1-2 cm Piétin - verse

Pour le risque climatique, les tendances indiquées le 10/03 sont confirmées avec un niveau caractéristique d'une année à **risque moyen**. Il devrait légèrement progresser si le prochain épisode pluvieux annoncé se confirme.

En parcelles, la maladie est très peu présente d'après les premières observations (situation classique dans la région à cette date).

Pour les situations où l'intervention à base de prochloraze seul est envisagée, l'application est à prévoir du 25 au 31 mars. Dans tous les autres cas de figure, il est trop tôt pour intervenir (voir prochains bulletins).

Rappelons que la protection anti-piétin ne doit pas être systématique mais raisonnée selon les parcelles (voir bulletin du 11/02).

ORGE DE PRINTEMPS Pucerons

Surveiller les semis de janvier en Charente-Maritime ; en effet, les conditions climatiques sont très favorables à ces ravageurs depuis quelques jours.

N'envisager une intervention que si le seuil de 1 plante sur 10 avec pucerons est atteint (ou si une fréquence légèrement inférieure à cette valeur se maintient pendant 8-10 jours).

TOUTES CULTURES Campagnols

Des piégeages effectués fin février dans le secteur d'Aiffres-Chizé (79) ont confirmé les tendances observées mi-décembre : Les populations sont très faibles (inférieures à 55 par ha), le pourcentage de jeunes a fortement diminué.

Aucun risque à moyen terme.



COLZA

Mélégèthes :
Vol important

BLE

Piétin-verse :
Ne pas intervenir
avant le 25 mars



751

D340 Jo 40830